

СОГЛАСОВАНО

Заместитель руководителя
Россельхознадзора

24.08.2015

ИНСТРУКЦИЯ

по применению Адилина-супер для бескровного умерщвления животных
(Организация – разработчик: ФГБНУ «Федеральный центр
токсикологической, радиационной и биологической безопасности», 420075,
г. Казань, Научный городок-2)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование Адилин-супер (Adilinum-super).

Международное непатентованное наименование: бисдиметилсульфат бисдиметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты.

2. Лекарственная форма: порошок для приготовления раствора для инъекций, содержащий в 100 мг, 95 мг действующего вещества – бисдиметилсульфата бисдиметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты.

3. По внешнему виду Адилин-супер представляет собой мелкокристаллический порошок белого или кремового цвета, хорошо растворимый в воде. Срок годности Адилина-супер при соблюдении условий хранения - 1 год с даты производства. Готовые к применению растворы Адилина-супер хранят в течение 1 суток. Запрещается использовать Адилин-супер по истечении срока годности.

4. Адилин-супер выпускают расфасованным по 50 г, 100 г и 500 г в банки из полиэтилена высокого давления с винтовой горловиной соответствующей вместимости, герметично укупоренных крышками. Каждая упаковка снабжена инструкцией по применению.

5. Хранят Адилин-супер в закрытой упаковке производителя, в сухом, защищенном от света, недоступном для посторонних лиц месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5°C до 25°C.

6. Адилин-супер следует хранить в местах, недоступных для детей.

7. Утилизация (инактивация) препарата с истекшим сроком годности и его остатков после использования, а также серии препарата, не выдержавшей контрольных испытаний, проводится растворением в 1%-ном водном растворе едкого натра или 5%-ном водном растворе соды с последующим кипячением в течение 10 мин.

Для инактивации емкостей, содержащих остатки препарата и инструментов (шприцы, инъекторы), используют кипячение в 1%-ном растворе едкого натра или 5%-ном – соды в течение 10 минут, после чего их ополаскивают водой. Далее утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Отпускается по рецепту ветеринарного врача.

II. Фармакологические (биологические) свойства

9. Входящий в состав Адилаина-супер бисдиметилсульфат бисдиметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты по механизму действия на организм животных является деполаризующим миорелаксантом.

Адилиин-супер по степени воздействия на организм относится к высокоопасным веществам (2 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

10. В органах и тканях животных бисдиметилсульфат бисдиметиламиноэтилового эфира янтарной кислоты подвергается метаболическому физико-химическому и ферментативному разложению на нетоксичные метаболиты: холин и янтарную кислоту.

III. Порядок применения

11. Адилиин-супер применяют для вынужденного бескровного умерщвления животных с целью профилактики распространения и ликвидации очагов инфекций, в том числе при особо опасных заболеваниях, таких как бешенство, сибирская язва, африканская чума свиней, грипп птиц и другие, когда необходимо ограничить поступление крови и других биологических жидкостей в окружающую среду, а также для планового умерщвления пушных зверей в звероводческих хозяйствах.

12. Противопоказаний для применения Адилаина-супер не установлено.

13. Рабочие растворы препарата готовят путем растворения порошка водой в соотношении 1:1. Готовый раствор Адилаина-супер для умерщвления животных вводят животным однократно, внутримышечно, в следующих дозах:

Вид животных	Доза, мг/кг массы животного
Крупный рогатый скот	5
Свиньи	5
Овцы	5
Кролики	4
Норки	4
Соболи	4
Песцы	5
Лисицы	5
Кошки	4
Собаки	5
Домашняя птица	3

14. Симптомы передозировки Адилаина-супер не установлены.

15. Особенности действия Адилаина-супер при первом введении не учитываются.

16. Адилиин-супер без ограничений применяют для умерщвления животных беременных, в период лактации, а также их потомства.

17. Адилиин-супер применяют однократно.

18. При применении Адилаина-супер побочные действия не учитываются.

19. Взаимодействие с другими лекарственными препаратами и (или) пищевыми продуктами, кормами отсутствует.

20. После применения Адилина-супер трупы животных подлежат уничтожению или утилизации в соответствии с требованиями законодательства.

IV. Меры личной профилактики

21. При применении Адилина-супер следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. Все лица, участвующие в проведении умерщвления животных, должны быть одеты в спецодежду (резиновые сапоги, халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки) и обеспечены средствами индивидуальной защиты – очками закрытого типа. Во время работы запрещается принимать пищу, пить и курить. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, необходимо немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Адилином-супер. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата и этикетку).

Наименования и адреса
производственных площадок
производителя лекарственного
препарата для ветеринарного
применения.

ФГБНУ «Федеральный центр
токсикологической, радиационной
и биологической безопасности»,
420075, Россия, г. Казань, Научный
городок-2

Наименование, адрес организации,
уполномоченной держателем или
владельцем регистрационного
удостоверения лекарственного
препарата на принятие претензий от
потребителя.

ФГБНУ «Федеральный центр
токсикологической, радиационной
и биологической безопасности»,
420075, г. Казань, Научный
городок-2

С утверждением настоящей инструкции считать утратившей силу инструкцию, утвержденную Россельхознадзором от 03.12.2014 г.

Номер регистрационного удостоверения 66-3-9.16-3367 № ПВР-3-7.7/02169